

Congenital Syphilis




Learn More



What it is

Congenital syphilis (CS) occurs when people pass syphilis to their babies during pregnancy. Syphilis is an STI that can cause serious health problems without treatment.



Babies born with CS can have

- Deformed bones
- Severe anemia (low blood count)
- Enlarged liver and spleen
- Jaundice (yellowing of the skin or eyes)
- Brain and nerve problems, like blindness or deafness
- Meningitis
- Skin rashes

When should you get tested?

- ✓ First prenatal visit or as soon as possible during pregnancy.
- ✓ Third trimester after 28 weeks of pregnancy
- ✓ Time of delivery



Can it be prevented?

Your baby will not get CS if you do not have syphilis. There are two important things you can do to protect your baby from getting CS and the health problems associated with the infection:

- Get a **syphilis test** the first time you see a healthcare provider during pregnancy.
- Reduce your risk of **getting syphilis** before and during your pregnancy.

If you are sexually active, have an open and honest conversation with your healthcare provider. Ask them if you should get tested for syphilis and other STIs.



Is there treatment?

Yes! Babies who have CS need to be treated with antibiotics **right away**—or they can develop serious health problems. Follow-up testing is required to make sure that the treatment worked.

For more information, visit: <https://www.cdc.gov/syphilis/about/>



TEXAS
Health and Human
Services

Texas Department of State
Health Services


dshs.texas.gov

Sífilis congénita



Lo que es

La sífilis congénita (SC) ocurre cuando las personas transmiten la sífilis a sus bebés durante el embarazo. La sífilis es una ITS que puede causar graves problemas de salud sin tratamiento.



Los bebés que nacen con SC pueden tener

- Huesos deformes
- Anemia grave (recuento sanguíneo bajo)
- Hígado y bazo agrandados
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos)
- Problemas cerebrales y nerviosos, como ceguera o sordera.
- Meningitis
- Erupciones en la piel



¿Cuándo debería hacerse la prueba?

- ✓ Primera visita prenatal o lo antes posible durante el embarazo.
- ✓ Tercer trimestre después de las 28 semanas de embarazo.
- ✓ Hora del parto

¿Se puede prevenir?

Si su bebé no contraerá SC si usted no tiene sífilis. Hay dos cosas importantes que puede hacer para proteger a su bebé de contraer SC y de los problemas de salud asociados con la infección:

- Hágase una prueba de sífilis la primera vez que consulte a un proveedor de atención médica durante el embarazo.
- Reduzca su riesgo de contraer sífilis antes y durante el embarazo. Si es sexualmente activo, mantenga una conversación abierta y honesta con su proveedor de atención médica. Pregúntele si debería hacerse la prueba de sífilis y otras ITS.



¿Hay tratamiento?

¡SÍ! Los bebés que tienen CS necesitan ser tratados con antibióticos de inmediato, o pueden desarrollar problemas de salud graves. Se requieren pruebas de seguimiento para asegurarse de que el tratamiento haya funcionado.

Para más información visite: <https://bit.ly/4col0cz>

Aprende más



TEXAS
Health and Human
Services

Texas Department of State
Health Services

dshs.texas.gov